

Placette n°	Tho-2013-01	Tho-2013-02	Tho-2013-03	Tho-2013-04	Tho-2013-05	Tho-2013-06	
Descriptif	1 Moliniaie	2 Frangulaie à Molinie	3 Boulaie-tremblaie II	4 Prairie Cirsium palustris & Holcus	5 Moliniaie Sphagnum	6 Joncaie secondaire	
Situation & topographie	fosse de tourbage	Butte	Butte				
Substrat	tourbe minéralisée	tourbe minéralisée	tourbe minéralisée				
Aire placette (m²)	4	4	100	4	4	4	
Situations sur transect	de 0 à 20,4 m						
Altitude (m)	585	587	587	588	585	585	
Lambert II x	980424	980372	980381	980347	980308	980317	
Lambert II y	6782887	6782895	6782937	6782973	6782866	6782849	
Hydromorphie & trophie	hygrophile (battement nappe)	hygrophile (battement nappe)	hygrophile	hygrophile (battement nappe)	hygrophile (battement nappe)	hygrophile (battement nappe)	
Date relevé	01/07/2013	01/07/2013	01/07/2013	01/07/2013	01/07/2013	01/07/2013	
Nombre d'occurrences des sp.	9	8	14	12	7	5	
Phytosociologie (alliance)	<i>Molinion caeruleae</i> W.Koch 1926	<i>Salicion cinereae</i> Th.Müll. et Görs 1958	<i>Betulion pubescens</i> W.Lohmeyer & Tüxen	<i>Juncion acutiflori</i> Braun - Blanq	<i>Molinion caeruleae</i> W.Koch 1926	<i>Juncion acutiflori</i> Braun - Blanq	
Code Corine-Biotope Typologie Corine-Biotope	51.2 - Tourbières à Molinie bleue	44.992 - Saussaies à sphaignes	44.A - Bois de bouleaux à sphaignes	37.217 - Prairies à Junc diffus	37.312 - Prairies à Molinie acidiphile	37.217 - Prairies à Junc diffus	
Code Eur 15 Typologie Natura 2000	7220 - Tourbières hautes dégradées	hors Nat. 2000	91D0 - Tourbières boisées	hors Nat. 2000	6410 - Prairies à molinie	hors Nat. 2000	
Gestion ou perturbation antérieure	tourbage				tourbage		
Etat de conservation (bon / moyen / insuffisant)	Moyen	Moyen	Moyen	Moyen	Moyen	Mauvais	
Evolution de l'état de conservation							
Strate arborescente	0%	95%	30%	0%	0%	0%	
Strate arbustive	0%	0%	15%	0%	0%	0%	
Strate herbacée	95%	35%	95%	90%	50%	50%	
Strate bryologique	0%	+	0%	0%	50%	+	
Descriptif	1 Moliniaie	2 Frangulaie à Molinie	3 Boulaie-tremblaie II	4 Prairie Cirsium palustris & Holcus	5 Moliniaie Sphagnum	6 Joncaie secondaire	
STRATES	TAXON	Tho_2013_01	Tho_2013_02	Tho_2013_03	Tho_2013_04	Tho_2013_05	Tho_2013_06
arborescente	<i>Betula pubescens</i> Ehrh.			60%			
arborescente	<i>Populus tremula</i> L.			30%			
arborescente	<i>Frangula alnus</i> Mill.		95%	+			
arbustif	<i>Populus tremula</i> L.			15%			
arbustif	<i>Salix aurita</i> L.			+			
herbacée	<i>Agrostis canina</i> L.			5%	5%	+	+
herbacée	<i>Angelica sylvestris</i> L.	+			+		
herbacée	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.			30%			
herbacée	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard	+				+	
herbacée	<i>Carex ovalis</i> Gooden.				15%		
herbacée	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	+			30%		
herbacée	<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	+	+				
herbacée	<i>Eriophorum vaginatum</i> L.	+					
herbacée	<i>Holcus lanatus</i> L.				40%		
herbacée	<i>Juncus effusus</i> L.			+	10%		50%
herbacée	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.				+		
herbacée	<i>Lycchnis flos-cuculi</i> L.				+		
herbacée	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	90%	10%	50%	+	50%	
herbacée	<i>Polygonum bistorta</i> L.	15%		90	5%		
herbacée	<i>Rubus idaeus</i> L.		30%	+			
herbacée	<i>Rubus</i> sp.		+				
herbacée	<i>Rumex acetosa</i> L.			5%			
herbacée	<i>Viola palustris</i> L.					+	
muscinale	<i>Polytrichum commune</i> Hedw.		+				
muscinale	<i>Sphagnum acutifolium</i> Ehrh. ex Schrad.					50%	
muscinale	<i>Sphagnum cuspidatum</i> Ehrh. ex Hoffm.						+